

Regressionsgrading bei Kolonkarzinom (Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum 1997)

Grad 0 - (Keine Veränderung)

Weder Nekrose noch zelluläre oder strukturelle Veränderungen nachweisbar

Grad 1 - (Geringe Regression)

Grad 1a

Nekrose oder Verschwinden des Tumors in weniger als einem Drittel der Läsion oder nur zelluläre oder strukturelle Veränderungen

Grad 1b

Nekrose oder Verschwinden des Tumors in weniger als zwei Drittel der Läsion, aber vitaler Tumor noch vorhanden

Grad 2 - (Mäßiggradige Regression)

Nekrose oder Verschwinden des Tumors in mehr als zwei Drittel der Läsion, aber vitaler Tumor noch vorhanden

Grad 3 - (Starke Regression)

Gesamte Läsion nekrotisch und/oder durch Fibrose mit oder ohne granulomatöse Reaktion ersetzt, keine vitalen Tumorzellen

Literatur:

C.Wittekind, A.Tannapfel (2003) Regressionsgrading des präoperativ-radiochemotherapierten Rektumkarzinoms
Pathologe 24:61–65

Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) (1997) Japanese classification of colorectal carcinoma, 1st English edn.Kanehara & Co,Tokyo

Gemeinschaftspraxis für Pathologie
in Gütersloh



[Start](#) [Home](#) [Diagnostik](#) [Info / Service](#) [OM](#) [Zusammenarbeit](#) [News / Termine](#) [Konferenzen](#) [Kontakt](#) [Impressum](#)